

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	317	217	107	104
ロイシン	1.9%	535	397	191	165
リジン	1.8%	515	199	98	177
メチオニン	0.7%	183	199	93	
シスチン	0.4%	99			
メチオニン・シスチン計	1.0%	281	379	182	121
フェニルアラニン	1.1%	303	271	126	
チロシン	0.9%	241			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	543	434	208	205
スレオニン	1.1%	300	253	121	135
トリプトファン	0.3%	91	83	39	45
バリン	1.3%	372	289	137	109
ヒスチジン	1.0%	280	112	53	50
アルギニン	1.7%	472	199	98	143

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	317	273	250	180	109	152
ロイシン	535	461	440	410	105	112
リジン	515	444	340	360	131	123
メチオニン・シスチン計	281	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	543	468	380	390	123	120
スレオニン	300	259	250	210	103	123
トリプトファン	91	79	60	70	131	112
バリン	372	320	310	220	103	146
ヒスチジン	280	241	-	120	-	201
全窒素量(g)	1.2					

