

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	324	217	146
ロイシン	1.5%	558	397	261
リジン	1.3%	503	199	134
メチオニン	0.4%	171	199	127
シスチン	0.3%	115		
メチオニン・シスチン計	0.7%	285	379	250
フェニルアラニン	0.9%	331	271	173
チロシン	0.6%	244		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	575	434	284
スレオニン	0.8%	303	253	165
トリプトファン	0.2%	93	83	54
バリン	1.0%	371	289	188
ヒスチジン	0.7%	279	112	73
アルギニン	1.2%	445	199	134

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	324	275	250	180
ロイシン	558	474	440	410	108	116
リジン	503	428	340	360	126	119
メチオニン・シスチン計	285	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	575	489	380	390	129	125
スレオニン	303	257	250	210	103	123
トリプトファン	93	79	60	70	132	113
バリン	371	316	310	220	102	144
ヒスチジン	279	237	-	120	-	197
全窒素量(g)	1.2					

