

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			
イソロイシン	1.0%	301	217	119	116
ロイシン	1.7%	521	397	214	185
リジン	1.5%	477	199	110	198
メチオニン	0.5%	155	199	104	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.8%	256	379	204	135
フェニルアラニン	1.0%	303	271	141	
チロシン	0.7%	228			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	531	434	232	229
スレオニン	0.9%	276	253	135	151
トリプトファン	0.3%	84	83	44	50
バリン	1.1%	340	289	154	122
ヒスチジン	0.8%	261	112	60	57
アルギニン	1.2%	389	199	110	160

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	301	280	250	180	112	155
ロイシン	521	484	440	410	110	118
リジン	477	444	340	360	131	123
メチオニン・シスチン計	256	238	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	531	494	380	390	130	127
スレオニン	276	257	250	210	103	122
トリプトファン	84	79	60	70	131	112
バリン	340	316	310	220	102	144
ヒスチジン	261	242	-	120	-	202
全窒素量(g)	1.1					

