

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	336	217	133	129
ロイシン	1.6%	567	397	238	206
リジン	1.6%	544	199	122	220
メチオニン	0.6%	204	199	115	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.9%	317	379	227	150
フェニルアラニン	0.9%	331	271	157	
チロシン	0.8%	263			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	595	434	259	255
スレオニン	0.9%	319	253	150	168
トリプトファン	0.3%	102	83	49	56
バリン	1.2%	404	289	171	136
ヒスチジン	1.0%	345	112	66	63
アルギニン	1.4%	494	199	122	178

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	336	269	250	180
ロイシン	567	455	440	410	103	111
リジン	544	436	340	360	128	121
メチオニン・シスチン計	317	254	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	595	477	380	390	126	122
スレオニン	319	256	250	210	102	122
トリプトファン	102	82	60	70	136	117
バリン	404	324	310	220	104	147
ヒスチジン	345	277	-	120	-	231
全窒素量(g)	1.2					

