

ver.4 このレシピのエネルギー		97	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.62	日分となります
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする
		7/17(wed)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		
		グラム		総重量			NRC		
				水分			AAFCO		
				乾燥重量			老齢犬用		
				エネルギー			「小動物の臨床栄養学」より		
				エネルギー密度			↓この範囲内！		
							3.0 ~ 4.0		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	289	217	115	112
ロイシン	1.6%	487	397	205	178
リジン	1.6%	492	199	106	190
メチオニン	0.5%	154	199	100	
シスチン	0.3%	86			
メチオニン・シスチン計	0.8%	239	379	196	130
フェニルアラニン	0.9%	273	271	136	
チロシン	0.7%	214			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	487	434	223	220
スレオニン	0.9%	278	253	130	145
トリプトファン	0.3%	81	83	42	48
バリン	1.1%	327	289	148	118
ヒスチジン	0.9%	260	112	57	54
アルギニン	1.3%	396	199	106	154

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	289	293	250	180	117	163
ロイシン	487	494	440	410	112	120
リジン	492	498	340	360	147	138
メチオニン・シスチン計	239	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	487	493	380	390	130	126
スレオニン	278	282	250	210	113	134
トリプトファン	81	82	60	70	137	117
バリン	327	332	310	220	107	151
ヒスチジン	260	264	-	120	-	220
全窒素量(g)	1.0					

