

| アミノ酸(参考) | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | |
| | /DM | mg | NRC | |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 0.9% | 291 | 217 | 119 |
| ロイシン | 1.6% | 490 | 397 | 212 |
| リジン | 1.6% | 501 | 199 | 109 |
| メチオニン | 0.5% | 167 | 199 | 103 |
| シスチン | 0.3% | 87 | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.8% | 254 | 379 | 203 |
| フェニルアラニン | 0.9% | 281 | 271 | 141 |
| チロシン | 0.7% | 224 | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.6% | 505 | 434 | 231 |
| スレオニン | 0.9% | 282 | 253 | 134 |
| トリプトファン | 0.3% | 81 | 83 | 44 |
| バリン | 1.1% | 348 | 289 | 153 |
| ヒスチジン | 0.7% | 223 | 112 | 59 |
| アルギニン | 1.2% | 376 | 199 | 109 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 291 | 279 | 250 | 180 |
| ロイシン | 490 | 470 | 440 | 410 | 107 | 115 |
| リジン | 501 | 480 | 340 | 360 | 141 | 133 |
| メチオニン・シスチン計 | 254 | 244 | 220 | 160 | 111 | 152 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 505 | 484 | 380 | 390 | 127 | 124 |
| スレオニン | 282 | 271 | 250 | 210 | 108 | 129 |
| トリプトファン | 81 | 77 | 60 | 70 | 129 | 110 |
| バリン | 348 | 334 | 310 | 220 | 108 | 152 |
| ヒスチジン | 223 | 214 | - | 120 | - | 178 |
| 全窒素量(g) | 1.0 | | | | | |

