

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	278	217	124
ロイシン	1.4%	464	397	221
リジン	1.5%	481	199	114
メチオニン	0.5%	156	199	107
シスチン	0.2%	81		
メチオニン・シスチン計	0.7%	238	379	212
フェニルアラニン	0.8%	263	271	147
チロシン	0.6%	206		
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	468	434	241
スレオニン	0.8%	267	253	140
トリプトファン	0.2%	77	83	46
バリン	1.0%	321	289	160
ヒスチジン	0.9%	301	112	62
アルギニン	1.1%	362	199	114

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	278	290	250	180
ロイシン	464	483	440	410	110	118
リジン	481	501	340	360	147	139
メチオニン・シスチン計	238	247	220	160	112	155
フェニルアラニン・チロシン計	468	488	380	390	128	125
スレオニン	267	278	250	210	111	132
トリプトファン	77	80	60	70	134	115
バリン	321	334	310	220	108	152
ヒスチジン	301	313	-	120	-	261
全窒素量(g)	1.0					

