

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量			
		NRC		AAFCO	
		/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	306	217	93	90
ロイシン	2.1%	514	397	166	144
リジン	2.1%	517	199	85	154
メチオニン	0.8%	185	199	80	
シスチン	0.4%	89			
メチオニン・シスチン計	1.1%	275	379	158	105
フェニルアラニン	1.2%	287	271	110	
チロシン	1.0%	235			
フェニルアラニン・チロシン計	2.1%	522	434	180	178
スレオニン	1.2%	288	253	105	117
トリプトファン	0.4%	87	83	34	39
バリン	1.5%	362	289	119	95
ヒスチジン	1.4%	333	112	46	44
アルギニン	1.7%	420	199	85	124

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	306	277	250	180	111	154
ロイシン	514	465	440	410	106	114
リジン	517	469	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	275	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	522	474	380	390	125	121
スレオニン	288	261	250	210	104	124
トリプトファン	87	79	60	70	132	113
バリン	362	328	310	220	106	149
ヒスチジン	333	302	-	120	-	252
全窒素量(g)	1.1					

