

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	316	217	92	90
ロイシン	2.2%	528	397	165	143
リジン	2.2%	543	199	85	153
メチオニン	0.8%	187	199	80	
シスチン	0.4%	93			
メチオニン・シスチン計	1.2%	282	379	158	104
フェニルアラニン	1.2%	298	271	109	
チロシン	1.0%	246			
フェニルアラニン・チロシン計	2.2%	544	434	180	177
スレオニン	1.2%	298	253	104	117
トリプトファン	0.4%	89	83	34	39
バリン	1.5%	374	289	119	95
ヒスチジン	1.4%	340	112	46	44
アルギニン	1.7%	409	199	85	124

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	316	273	250	180
ロイシン	528	457	440	410	104	112
リジン	543	470	340	360	138	131
メチオニン・シスチン計	282	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	544	471	380	390	124	121
スレオニン	298	258	250	210	103	123
トリプトファン	89	77	60	70	129	110
バリン	374	324	310	220	104	147
ヒスチジン	340	294	-	120	-	245
全窒素量(g)	1.2					

