

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	346	217	98	96
ロイシン	2.3%	596	397	176	152
リジン	2.3%	605	199	90	163
メチオニン	0.8%	205	199	85	
シスチン	0.4%	104			
メチオニン・シスチン計	1.2%	310	379	168	111
フェニルアラニン	1.3%	334	271	116	
チロシン	1.1%	277			
フェニルアラニン・チロシン計	2.4%	611	434	191	188
スレオニン	1.3%	330	253	111	124
トリプトファン	0.4%	97	83	36	41
バリン	1.6%	402	289	127	101
ヒスチジン	1.1%	274	112	49	46
アルギニン	1.8%	472	199	90	132

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	346	272	250	180
ロイシン	596	468	440	410	106	114
リジン	605	475	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	310	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	611	480	380	390	126	123
スレオニン	330	260	250	210	104	124
トリプトファン	97	77	60	70	128	109
バリン	402	316	310	220	102	144
ヒスチジン	274	215	-	120	-	179
全窒素量(g)	1.3					

