

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	347	217	146
ロイシン	1.5%	577	397	262
リジン	1.5%	572	199	135
メチオニン	0.5%	204	199	127
シスチン	0.3%	109		
メチオニン・シスチン計	0.8%	312	379	250
フェニルアラニン	0.9%	329	271	173
チロシン	0.7%	261		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	590	434	285
スレオニン	0.9%	327	253	165
トリプトファン	0.3%	99	83	54
バリン	1.0%	403	289	189
ヒスチジン	1.0%	377	112	73
アルギニン	1.2%	476	199	135

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	347	276	250	180
ロイシン	577	458	440	410	104	112
リジン	572	454	340	360	134	126
メチオニン・シスチン計	312	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	590	468	380	390	123	120
スレオニン	327	260	250	210	104	124
トリプトファン	99	79	60	70	131	112
バリン	403	320	310	220	103	145
ヒスチジン	377	299	-	120	-	249
全窒素量(g)	1.3					

