



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	347	217	152	148
ロイシン	1.5%	594	397	272	236
リジン	1.4%	571	199	140	252
メチオニン	0.5%	209	199	132	
シスチン	0.3%	113			
メチオニン・シスチン計	0.8%	324	379	260	172
フェニルアラニン	0.9%	346	271	180	
チロシン	0.7%	276			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	622	434	296	292
スレオニン	0.9%	340	253	172	192
トリプトファン	0.3%	101	83	56	64
バリン	1.0%	416	289	196	156
ヒスチジン	0.7%	288	112	76	72
アルギニン	1.3%	503	199	140	204

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	347	269	250	180
ロイシン	594	461	440	410	105	112
リジン	571	443	340	360	130	123
メチオニン・シスチン計	324	251	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	622	483	380	390	127	124
スレオニン	340	264	250	210	105	126
トリプトファン	101	78	60	70	131	112
バリン	416	323	310	220	104	147
ヒスチジン	288	223	-	120	-	186
全窒素量(g)	1.3					

