

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	354	217	127	124
ロイシン	1.8%	603	397	228	198
リジン	1.7%	585	199	117	211
メチオニン	0.6%	216	199	111	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	1.0%	333	379	218	144
フェニルアラニン	1.0%	346	271	151	
チロシン	0.8%	276			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	622	434	248	245
スレオニン	1.0%	343	253	144	161
トリプトファン	0.3%	102	83	47	54
バリン	1.3%	425	289	164	131
ヒスチジン	0.8%	273	112	64	60
アルギニン	1.6%	521	199	117	171

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	354	266	250	180	106	148
ロイシン	603	453	440	410	103	110
リジン	585	440	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	333	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	622	468	380	390	123	120
スレオニン	343	258	250	210	103	123
トリプトファン	102	76	60	70	127	109
バリン	425	319	310	220	103	145
ヒスチジン	273	205	-	120	-	171
全窒素量(g)	1.3					

