

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	318	217	132
ロイシン	1.5%	529	397	237
リジン	1.4%	480	199	122
メチオニン	0.5%	189	199	115
シスチン	0.3%	122		
メチオニン・シスチン計	0.9%	311	379	227
フェニルアラニン	0.9%	316	271	157
チロシン	0.7%	246		
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	562	434	258
スレオニン	0.9%	298	253	150
トリプトファン	0.3%	96	83	49
バリン	1.1%	387	289	171
ヒスチジン	0.8%	292	112	66
アルギニン	1.3%	448	199	122

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	318	285	250	180
ロイシン	529	474	440	410	108	116
リジン	480	431	340	360	127	120
メチオニン・シスチン計	311	279	220	160	127	174
フェニルアラニン・チロシン計	562	504	380	390	133	129
スレオニン	298	267	250	210	107	127
トリプトファン	96	86	60	70	143	123
バリン	387	347	310	220	112	158
ヒスチジン	292	262	-	120	-	218
全窒素量(g)	1.1					

