

アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.2%	14	217	25
ロイシン	0.3%	20	397	45
リジン	0.3%	17	199	23
メチオニン	0.1%	6	199	22
シスチン	0.1%	6		
メチオニン・シスチン計	0.2%	11	379	43
フェニルアラニン	0.2%	16	271	30
チロシン	0.1%	9		
フェニルアラニン・チロシン計	0.4%	24	434	49
スレオニン	0.2%	16	253	29
トリプトファン	0.1%	5	83	9
バリン	0.3%	19	289	33
ヒスチジン	0.1%	8	112	13
アルギニン	0.2%	12	199	23

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	14	229	250	180
ロイシン	20	344	440	410	78	84
リジン	17	290	340	360	85	80
メチオニン・シスチン計	11	194	220	160	88	121
フェニルアラニン・チロシン計	24	408	380	390	107	105
スレオニン	16	262	250	210	105	125
トリプトファン	5	78	60	70	131	112
バリン	19	314	310	220	101	143
ヒスチジン	8	130	-	120	-	108
全窒素量(g)	0.1					

