

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	276	217	121	118
ロイシン	1.4%	459	397	216	188
リジン	1.4%	461	199	111	200
メチオニン	0.5%	171	199	105	
シスチン	0.3%	87			
メチオニン・シスチン計	0.8%	260	379	207	137
フェニルアラニン	0.8%	265	271	143	
チロシン	0.7%	211			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	476	434	235	232
スレオニン	0.8%	264	253	137	153
トリプトファン	0.2%	79	83	45	51
バリン	1.0%	322	289	156	124
ヒスチジン	1.0%	317	112	60	57
アルギニン	1.3%	413	199	111	162

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	276	274	250	180	110	152
ロイシン	459	455	440	410	103	111
リジン	461	457	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	260	257	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	476	471	380	390	124	121
スレオニン	264	261	250	210	104	124
トリプトファン	79	78	60	70	131	112
バリン	322	319	310	220	103	145
ヒスチジン	317	314	-	120	-	262
全窒素量(g)	1.0					

