

| アミノ酸(参考) | | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | | |
| | /DM | mg | NRC | | AAFCO |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 0.9% | 415 | 217 | 171 | 167 |
| ロイシン | 1.5% | 696 | 397 | 306 | 266 |
| リジン | 1.6% | 698 | 199 | 158 | 284 |
| メチオニン | 0.5% | 247 | 199 | 149 | |
| シスチン | 0.3% | 129 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.8% | 378 | 379 | 293 | 194 |
| フェニルアラニン | 0.9% | 400 | 271 | 203 | |
| チロシン | 0.7% | 318 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.6% | 719 | 434 | 333 | 329 |
| スレオニン | 0.9% | 392 | 253 | 194 | 216 |
| トリプトファン | 0.3% | 118 | 83 | 63 | 72 |
| バリン | 1.1% | 478 | 289 | 221 | 176 |
| ヒスチジン | 0.9% | 423 | 112 | 86 | 81 |
| アルギニン | 1.3% | 599 | 199 | 158 | 230 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 415 | 275 | 250 | 180 |
| ロイシン | 696 | 462 | 440 | 410 | 105 | 113 |
| リジン | 698 | 463 | 340 | 360 | 136 | 129 |
| メチオニン・シスチン計 | 378 | 251 | 220 | 160 | 114 | 157 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 719 | 477 | 380 | 390 | 126 | 122 |
| スレオニン | 392 | 260 | 250 | 210 | 104 | 124 |
| トリプトファン | 118 | 78 | 60 | 70 | 130 | 112 |
| バリン | 478 | 317 | 310 | 220 | 102 | 144 |
| ヒスチジン | 423 | 280 | - | 120 | - | 234 |
| 全窒素量(g) | 1.5 | | | | | |

