

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	432	217	175	170
ロイシン	1.6%	724	397	313	271
リジン	1.6%	716	199	161	290
メチオニン	0.6%	264	199	152	
シスチン	0.3%	131			
メチオニン・シスチン計	0.9%	395	379	299	198
フェニルアラニン	0.9%	410	271	207	
チロシン	0.7%	325			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	735	434	340	336
スレオニン	0.9%	410	253	198	221
トリプトファン	0.3%	121	83	64	74
バリン	1.1%	504	289	225	179
ヒスチジン	1.1%	487	112	87	83
アルギニン	1.3%	602	199	161	235

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	432	280	250	180
ロイシン	724	470	440	410	107	115
リジン	716	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	395	256	220	160	117	160
フェニルアラニン・チロシン計	735	477	380	390	125	122
スレオニン	410	266	250	210	106	127
トリプトファン	121	78	60	70	131	112
バリン	504	327	310	220	105	148
ヒスチジン	487	316	-	120	-	263
全窒素量(g)	1.5					

