

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	407	217	190	185
ロイシン	1.4%	686	397	340	295
リジン	1.4%	680	199	175	315
メチオニン	0.5%	246	199	165	
シスチン	0.3%	133			
メチオニン・シスチン計	0.8%	381	379	325	215
フェニルアラニン	0.8%	402	271	225	
チロシン	0.6%	316			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	717	434	370	365
スレオニン	0.8%	403	253	215	240
トリプトファン	0.2%	118	83	70	80
バリン	1.0%	487	289	245	195
ヒスチジン	0.8%	382	112	95	90
アルギニン	1.2%	623	199	175	255

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	407	265	250	180
ロイシン	686	446	440	410	101	109
リジン	680	442	340	360	130	123
メチオニン・シスチン計	381	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	717	466	380	390	123	120
スレオニン	403	262	250	210	105	125
トリプトファン	118	77	60	70	128	110
バリン	487	317	310	220	102	144
ヒスチジン	382	249	-	120	-	207
全窒素量(g)	1.5					

