

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	394	217	164	160
ロイシン	1.5%	658	397	294	255
リジン	1.6%	683	199	151	272
メチオニン	0.6%	256	199	142	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.9%	375	379	281	186
フェニルアラニン	0.9%	371	271	194	
チロシン	0.7%	300			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	671	434	320	315
スレオニン	0.9%	385	253	186	207
トリプトファン	0.3%	110	83	60	69
バリン	1.1%	466	289	212	168
ヒスチジン	1.1%	457	112	82	78
アルギニン	1.3%	558	199	151	220

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	394	276	250	180
ロイシン	658	460	440	410	105	112
リジン	683	477	340	360	140	133
メチオニン・シスチン計	375	262	220	160	119	164
フェニルアラニン・チロシン計	671	469	380	390	123	120
スレオニン	385	269	250	210	108	128
トリプトファン	110	77	60	70	128	110
バリン	466	326	310	220	105	148
ヒスチジン	457	319	-	120	-	266
全窒素量(g)	1.4					

