

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	328	217	150	146
ロイシン	1.4%	562	397	269	233
リジン	1.4%	564	199	138	249
メチオニン	0.5%	198	199	130	
シスチン	0.3%	106			
メチオニン・シスチン計	0.8%	307	379	257	170
フェニルアラニン	0.8%	335	271	178	
チロシン	0.6%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	590	434	293	289
スレオニン	0.8%	328	253	170	190
トリプトファン	0.2%	94	83	55	63
バリン	1.0%	399	289	194	154
ヒスチジン	0.8%	308	112	75	71
アルギニン	1.2%	480	199	138	202

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	328	267	250	180	107	148
ロイシン	562	457	440	410	104	111
リジン	564	459	340	360	135	128
メチオニン・シスチン計	307	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	590	480	380	390	126	123
スレオニン	328	267	250	210	107	127
トリプトファン	94	77	60	70	128	110
バリン	399	325	310	220	105	148
ヒスチジン	308	250	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.2					

