

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	454	217	187	183
ロイシン	1.5%	763	397	335	291
リジン	1.5%	741	199	173	311
メチオニン	0.5%	257	199	163	
シスチン	0.3%	146			
メチオニン・シスチン計	0.8%	403	379	321	212
フェニルアラニン	0.9%	449	271	222	
チロシン	0.7%	349			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	798	434	365	360
スレオニン	0.9%	422	253	212	237
トリプトファン	0.3%	130	83	69	79
バリン	1.1%	530	289	242	192
ヒスチジン	0.9%	422	112	94	89
アルギニン	1.3%	655	199	173	252

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	454	282	250	180
ロイシン	763	473	440	410	108	115
リジン	741	460	340	360	135	128
メチオニン・シスチン計	403	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	798	495	380	390	130	127
スレオニン	422	262	250	210	105	125
トリプトファン	130	80	60	70	134	115
バリン	530	329	310	220	106	149
ヒスチジン	422	262	-	120	-	218
全窒素量(g)	1.6					

