



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	340	217	143	140
ロイシン	1.5%	566	397	257	223
リジン	1.5%	561	199	132	238
メチオニン	0.5%	184	199	125	
シスチン	0.3%	99			
メチオニン・シスチン計	0.7%	282	379	245	162
フェニルアラニン	0.9%	326	271	170	
チロシン	0.7%	257			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	583	434	279	276
スレオニン	0.8%	313	253	162	181
トリプトファン	0.2%	94	83	53	60
バリン	1.0%	395	289	185	147
ヒスチジン	1.0%	371	112	72	68
アルギニン	1.1%	427	199	132	193

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
	(mg)		1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
イソロイシン	340	292	250	180	117	162
ロイシン	566	485	440	410	110	118
リジン	561	481	340	360	141	134
メチオニン・シスチン計	282	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	583	500	380	390	132	128
スレオニン	313	268	250	210	107	128
トリプトファン	94	81	60	70	134	115
バリン	395	338	310	220	109	154
ヒスチジン	371	318	-	120	-	265
全窒素量(g)	1.2					

