

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	352	217	149
ロイシン	1.5%	594	397	267
リジン	1.5%	578	199	137
メチオニン	0.5%	200	199	129
シスチン	0.3%	111		
メチオニン・シスチン計	0.8%	311	379	255
フェニルアラニン	0.9%	346	271	176
チロシン	0.7%	274		
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	620	434	290
スレオニン	0.8%	330	253	169
トリプトファン	0.3%	100	83	55
バリン	1.0%	409	289	192
ヒスチジン	0.8%	332	112	75
アルギニン	1.2%	484	199	137

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	352	275	250	180
ロイシン	594	464	440	410	106	113
リジン	578	452	340	360	133	126
メチオニン・シスチン計	311	243	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	620	485	380	390	128	124
スレオニン	330	258	250	210	103	123
トリプトファン	100	78	60	70	131	112
バリン	409	320	310	220	103	146
ヒスチジン	332	260	-	120	-	216
全窒素量(g)	1.3					

