

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	360	217	163	159
ロイシン	1.4%	615	397	292	253
リジン	1.4%	604	199	150	271
メチオニン	0.5%	197	199	142	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.7%	307	379	279	185
フェニルアラニン	0.8%	351	271	193	
チロシン	0.7%	281			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	631	434	318	313
スレオニン	0.8%	336	253	185	206
トリプトファン	0.2%	100	83	60	69
バリン	1.0%	419	289	210	167
ヒスチジン	0.6%	244	112	82	77
アルギニン	1.1%	476	199	150	219

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	360	278	250	180	111	155
ロイシン	615	476	440	410	108	116
リジン	604	468	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	307	238	220	160	108	148
フェニルアラニン・チロシン計	631	489	380	390	129	125
スレオニン	336	260	250	210	104	124
トリプトファン	100	77	60	70	129	110
バリン	419	325	310	220	105	148
ヒスチジン	244	189	-	120	-	158
全窒素量(g)	1.3					

