

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	361	217	146	142
ロイシン	1.6%	625	397	261	227
リジン	1.6%	603	199	135	242
メチオニン	0.5%	200	199	127	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.8%	310	379	250	165
フェニルアラニン	0.9%	353	271	173	
チロシン	0.7%	285			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	638	434	284	281
スレオニン	0.9%	340	253	165	184
トリプトファン	0.3%	102	83	54	61
バリン	1.1%	421	289	188	150
ヒスチジン	0.6%	239	112	73	69
アルギニン	1.3%	498	199	135	196

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	361	280	250	180	112	156
ロイシン	625	486	440	410	110	118
リジン	603	469	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	310	241	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	638	496	380	390	130	127
スレオニン	340	264	250	210	106	126
トリプトファン	102	79	60	70	132	113
バリン	421	327	310	220	106	149
ヒスチジン	239	186	-	120	-	155
全窒素量(g)	1.3					

