

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	316	217	165	161
ロイシン	1.3%	554	397	295	256
リジン	1.3%	555	199	152	273
メチオニン	0.4%	183	199	143	
シスチン	0.2%	98			
メチオニン・シスチン計	0.6%	281	379	282	187
フェニルアラニン	0.7%	311	271	195	
チロシン	0.6%	245			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	556	434	321	317
スレオニン	0.7%	302	253	187	208
トリプトファン	0.2%	87	83	61	69
バリン	0.9%	374	289	213	169
ヒスチジン	0.4%	192	112	82	78
アルギニン	1.0%	439	199	152	221

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	316	280	250	180
ロイシン	554	491	440	410	112	120
リジン	555	492	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	281	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	556	493	380	390	130	126
スレオニン	302	268	250	210	107	128
トリプトファン	87	77	60	70	129	111
バリン	374	332	310	220	107	151
ヒスチジン	192	171	-	120	-	142
全窒素量(g)	1.1					

