

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	414	217	151	147
ロイシン	1.8%	722	397	270	234
リジン	1.7%	688	199	139	250
メチオニン	0.6%	220	199	131	
シスチン	0.3%	135			
メチオニン・シスチン計	0.9%	354	379	258	171
フェニルアラニン	1.1%	420	271	179	
チロシン	0.8%	325			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	744	434	294	290
スレオニン	0.9%	376	253	171	191
トリプトファン	0.3%	116	83	56	64
バリン	1.2%	480	289	195	155
ヒスチジン	0.6%	254	112	75	72
アルギニン	1.5%	610	199	139	203

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	414	281	250	180	113	156
ロイシン	722	490	440	410	111	120
リジン	688	467	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	354	241	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	744	506	380	390	133	130
スレオニン	376	256	250	210	102	122
トリプトファン	116	79	60	70	132	113
バリン	480	326	310	220	105	148
ヒスチジン	254	172	-	120	-	144
全窒素量(g)	1.5					

