



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	355	217	153	149
ロイシン	1.5%	614	397	274	238
リジン	1.5%	615	199	141	254
メチオニン	0.5%	196	199	133	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.8%	307	379	262	174
フェニルアラニン	0.9%	350	271	182	
チロシン	0.7%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	625	434	299	295
スレオニン	0.8%	321	253	174	194
トリプトファン	0.2%	95	83	57	65
バリン	1.0%	409	289	198	157
ヒスチジン	0.6%	225	112	77	73
アルギニン	1.2%	485	199	141	206

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	355	276	250	180
ロイシン	614	477	440	410	108	116
リジン	615	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	307	239	220	160	109	149
フェニルアラニン・チロシン計	625	486	380	390	128	125
スレオニン	321	249	250	210	100	119
トリプトファン	95	74	60	70	123	105
バリン	409	318	310	220	103	145
ヒスチジン	225	175	-	120	-	146
全窒素量(g)	1.3					

