

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	330	217	131	128
ロイシン	1.7%	570	397	235	204
リジン	1.6%	566	199	121	218
メチオニン	0.6%	196	199	114	
シスチン	0.3%	100			
メチオニン・シスチン計	0.9%	296	379	225	149
フェニルアラニン	0.9%	325	271	155	
チロシン	0.8%	261			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	586	434	256	252
スレオニン	0.9%	321	253	149	166
トリプトファン	0.3%	93	83	48	55
バリン	1.1%	390	289	169	135
ヒスチジン	0.8%	290	112	66	62
アルギニン	1.3%	440	199	121	176

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	330	281	250	180	113	156
ロイシン	570	486	440	410	110	118
リジン	566	482	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	296	252	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	586	500	380	390	131	128
スレオニン	321	273	250	210	109	130
トリプトファン	93	79	60	70	132	113
バリン	390	333	310	220	107	151
ヒスチジン	290	247	-	120	-	206
全窒素量(g)	1.2					

