

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	333	217	141	137
ロイシン	1.5%	567	397	251	218
リジン	1.6%	577	199	129	233
メチオニン	0.5%	189	199	122	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.8%	291	379	240	159
フェニルアラニン	0.9%	317	271	166	
チロシン	0.7%	257			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	574	434	274	270
スレオニン	0.8%	314	253	159	177
トリプトファン	0.2%	91	83	52	59
バリン	1.0%	387	289	181	144
ヒスチジン	0.6%	216	112	70	67
アルギニン	1.2%	458	199	129	189

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	333	281	250	180
ロイシン	567	477	440	410	108	116
リジン	577	486	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	291	245	220	160	112	153
フェニルアラニン・チロシン計	574	483	380	390	127	124
スレオニン	314	265	250	210	106	126
トリプトファン	91	77	60	70	128	109
バリン	387	326	310	220	105	148
ヒスチジン	216	182	-	120	-	151
全窒素量(g)	1.2					

