

| アミノ酸(参考) | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | |
| | /DM | mg | NRC | |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 1.2% | 371 | 217 | 119 |
| ロイシン | 2.0% | 628 | 397 | 214 |
| リジン | 2.0% | 624 | 199 | 110 |
| メチオニン | 0.6% | 197 | 199 | 104 |
| シスチン | 0.4% | 116 | | |
| メチオニン・シスチン計 | 1.0% | 312 | 379 | 204 |
| フェニルアラニン | 1.2% | 372 | 271 | 141 |
| チロシン | 0.9% | 287 | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 2.1% | 659 | 434 | 232 |
| スレオニン | 1.1% | 343 | 253 | 135 |
| トリプトファン | 0.3% | 102 | 83 | 44 |
| バリン | 1.4% | 429 | 289 | 154 |
| ヒスチジン | 0.8% | 249 | 112 | 60 |
| アルギニン | 1.6% | 510 | 199 | 110 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 371 | 286 | 250 | 180 |
| ロイシン | 628 | 484 | 440 | 410 | 110 | 118 |
| リジン | 624 | 481 | 340 | 360 | 142 | 134 |
| メチオニン・シスチン計 | 312 | 240 | 220 | 160 | 109 | 150 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 659 | 507 | 380 | 390 | 134 | 130 |
| スレオニン | 343 | 265 | 250 | 210 | 106 | 126 |
| トリプトファン | 102 | 79 | 60 | 70 | 131 | 112 |
| バリン | 429 | 330 | 310 | 220 | 107 | 150 |
| ヒスチジン | 249 | 192 | - | 120 | - | 160 |
| 全窒素量(g) | 1.3 | | | | | |

