



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	乾燥重量ベース
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	
イソロイシン	1.0%	305	217	121	118
ロイシン	1.6%	506	397	217	188
リジン	1.6%	509	199	112	201
メチオニン	0.5%	175	199	105	
シスチン	0.3%	90			
メチオニン・シスチン計	0.8%	265	379	207	137
フェニルアラニン	0.9%	289	271	143	
チロシン	0.7%	232			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	522	434	236	233
スレオニン	0.9%	285	253	137	153
トリプトファン	0.3%	84	83	45	51
バリン	1.1%	353	289	156	124
ヒスチジン	0.9%	277	112	61	57
アルギニン	1.3%	402	199	112	163

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	305	358	250	180
ロイシン	506	594	440	410	135	145
リジン	509	598	340	360	176	166
メチオニン・シスチン計	265	311	220	160	141	194
フェニルアラニン・チロシン計	522	614	380	390	161	157
スレオニン	285	335	250	210	134	159
トリプトファン	84	98	60	70	164	140
バリン	353	415	310	220	134	189
ヒスチジン	277	325	-	120	-	271
全窒素量(g)	0.9					

