

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	294	217	108	105
ロイシン	1.8%	500	397	193	167
リジン	1.8%	508	199	99	178
メチオニン	0.6%	175	199	93	
シスチン	0.3%	87			
メチオニン・シスチン計	0.9%	263	379	184	122
フェニルアラニン	1.0%	284	271	127	
チロシン	0.8%	229			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	513	434	210	207
スレオニン	1.0%	288	253	122	136
トリプトファン	0.3%	82	83	40	45
バリン	1.2%	353	289	139	110
ヒスチジン	0.8%	232	112	54	51
アルギニン	1.4%	395	199	99	144

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	294	282	250	180
ロイシン	500	480	440	410	109	117
リジン	508	487	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	263	252	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	513	492	380	390	129	126
スレオニン	288	276	250	210	110	131
トリプトファン	82	78	60	70	131	112
バリン	353	339	310	220	109	154
ヒスチジン	232	223	-	120	-	186
全窒素量(g)	1.0					

