

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	296	217	107	104
ロイシン	1.8%	500	397	192	166
リジン	1.8%	514	199	99	178
メチオニン	0.6%	173	199	93	
シスチン	0.3%	89			
メチオニン・シスチン計	0.9%	262	379	183	121
フェニルアラニン	1.0%	283	271	127	
チロシン	0.8%	227			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	510	434	209	206
スレオニン	1.0%	285	253	121	135
トリプトファン	0.3%	81	83	39	45
バリン	1.2%	349	289	138	110
ヒスチジン	0.7%	200	112	54	51
アルギニン	1.4%	402	199	99	144

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	296	287	250	180
ロイシン	500	484	440	410	110	118
リジン	514	498	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	262	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	510	493	380	390	130	126
スレオニン	285	276	250	210	110	131
トリプトファン	81	79	60	70	131	113
バリン	349	338	310	220	109	154
ヒスチジン	200	194	-	120	-	162
全窒素量(g)	1.0					

