



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	343	217	130	127
ロイシン	1.7%	579	397	233	202
リジン	1.5%	513	199	120	216
メチオニン	0.5%	185	199	113	
シスチン	0.4%	123			
メチオニン・シスチン計	0.9%	307	379	223	148
フェニルアラニン	1.0%	342	271	154	
チロシン	0.8%	268			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	610	434	254	251
スレオニン	0.9%	314	253	148	165
トリプトファン	0.3%	99	83	48	55
バリン	1.2%	412	289	168	134
ヒスチジン	0.9%	298	112	65	62
アルギニン	1.3%	446	199	120	175

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	343	293	250	180
ロイシン	579	494	440	410	112	121
リジン	513	438	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	307	262	220	160	119	164
フェニルアラニン・チロシン計	610	521	380	390	137	133
スレオニン	314	268	250	210	107	127
トリプトファン	99	84	60	70	141	121
バリン	412	352	310	220	113	160
ヒスチジン	298	254	-	120	-	212
全窒素量(g)	1.2					

