

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	乾燥重量ベース
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	
イソロイシン	0.9%	339	217	136	133
ロイシン	1.6%	564	397	244	212
リジン	1.6%	560	199	126	226
メチオニン	0.5%	197	199	119	
シスチン	0.3%	100			
メチオニン・シスチン計	0.8%	299	379	233	154
フェニルアラニン	0.9%	321	271	162	
チロシン	0.7%	257			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	578	434	266	262
スレオニン	0.9%	314	253	154	172
トリプトファン	0.3%	96	83	50	57
バリン	1.1%	396	289	176	140
ヒスチジン	1.1%	394	112	68	65
アルギニン	1.2%	447	199	126	183

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	339	290	250	180
ロイシン	564	481	440	410	109	117
リジン	560	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	299	255	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	578	494	380	390	130	127
スレオニン	314	268	250	210	107	128
トリプトファン	96	82	60	70	136	116
バリン	396	338	310	220	109	154
ヒスチジン	394	336	-	120	-	280
全窒素量(g)	1.2					

