



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	358	217	121	117
ロイシン	1.9%	596	397	216	187
リジン	1.9%	598	199	111	200
メチオニン	0.7%	209	199	105	
シスチン	0.3%	107			
メチオニン・シスチン計	1.0%	318	379	206	136
フェニルアラニン	1.1%	342	271	143	
チロシン	0.9%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	618	434	235	232
スレオニン	1.1%	333	253	136	152
トリプトファン	0.3%	102	83	44	51
バリン	1.3%	421	289	156	124
ヒスチジン	1.3%	415	112	60	57
アルギニン	1.4%	460	199	111	162

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	358	282	250	180
ロイシン	596	469	440	410	107	114
リジン	598	471	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	318	251	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	618	487	380	390	128	125
スレオニン	333	263	250	210	105	125
トリプトファン	102	80	60	70	134	115
バリン	421	331	310	220	107	151
ヒスチジン	415	327	-	120	-	273
全窒素量(g)	1.3					

