

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	340	217	135	132
ロイシン	1.6%	578	397	242	210
リジン	1.6%	574	199	125	224
メチオニン	0.5%	190	199	117	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.8%	295	379	231	153
フェニルアラニン	0.9%	337	271	160	
チロシン	0.7%	259			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	596	434	263	260
スレオニン	0.9%	324	253	153	171
トリプトファン	0.3%	94	83	50	57
バリン	1.1%	405	289	174	139
ヒスチジン	0.7%	263	112	68	64
アルギニン	1.3%	469	199	125	181

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	340	282	250	180	113	157
ロイシン	578	480	440	410	109	117
リジン	574	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	295	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	596	496	380	390	130	127
スレオニン	324	269	250	210	108	128
トリプトファン	94	78	60	70	130	112
バリン	405	337	310	220	109	153
ヒスチジン	263	219	-	120	-	182
全窒素量(g)	1.2					

