

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			
イソロイシン	1.0%	301	217	109	106
ロイシン	1.8%	515	397	195	169
リジン	1.8%	519	199	100	181
メチオニン	0.6%	177	199	95	
シスチン	0.3%	96			
メチオニン・シスチン計	1.0%	273	379	186	123
フェニルアラニン	1.0%	294	271	129	
チロシン	0.8%	244			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	539	434	212	209
スレオニン	1.0%	285	253	123	138
トリプトファン	0.3%	85	83	40	46
バリン	1.2%	354	289	140	112
ヒスチジン	0.6%	186	112	54	52
アルギニン	1.5%	421	199	100	146

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	301	338	250	180	135	188
ロイシン	515	578	440	410	131	141
リジン	519	583	340	360	172	162
メチオニン・シスチン計	273	307	220	160	140	192
フェニルアラニン・チロシン計	539	606	380	390	159	155
スレオニン	285	320	250	210	128	153
トリプトファン	85	95	60	70	159	136
バリン	354	397	310	220	128	181
ヒスチジン	186	208	-	120	-	174
全窒素量(g)	0.9					

