

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	345	217	117	114
ロイシン	1.9%	585	397	210	182
リジン	1.9%	588	199	108	194
メチオニン	0.7%	201	199	102	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	1.0%	306	379	200	133
フェニルアラニン	1.1%	330	271	139	
チロシン	0.9%	270			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	600	434	228	225
スレオニン	1.0%	321	253	133	148
トリプトファン	0.3%	97	83	43	49
バリン	1.3%	403	289	151	120
ヒスチジン	1.0%	311	112	59	55
アルギニン	1.5%	459	199	108	157

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	345	280	250	180
ロイシン	585	475	440	410	108	116
リジン	588	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	306	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	600	487	380	390	128	125
スレオニン	321	261	250	210	104	124
トリプトファン	97	79	60	70	131	112
バリン	403	328	310	220	106	149
ヒスチジン	311	253	-	120	-	211
全窒素量(g)	1.2					

