

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	347	217	135	131
ロイシン	1.7%	589	397	242	210
リジン	1.5%	537	199	124	224
メチオニン	0.5%	189	199	117	
シスチン	0.4%	130			
メチオニン・シスチン計	0.9%	320	379	231	153
フェニルアラニン	1.0%	346	271	160	
チロシン	0.8%	276			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	622	434	263	259
スレオニン	0.9%	318	253	153	171
トリプトファン	0.3%	102	83	50	57
バリン	1.2%	417	289	174	139
ヒスチジン	0.6%	207	112	67	64
アルギニン	1.3%	476	199	124	181

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	347	282	250	180
ロイシン	589	478	440	410	109	117
リジン	537	436	340	360	128	121
メチオニン・シスチン計	320	260	220	160	118	162
フェニルアラニン・チロシン計	622	505	380	390	133	130
スレオニン	318	258	250	210	103	123
トリプトファン	102	83	60	70	138	118
バリン	417	338	310	220	109	154
ヒスチジン	207	168	-	120	-	140
全窒素量(g)	1.2					

