



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	344	217	133	130
ロイシン	1.7%	590	397	238	207
リジン	1.7%	600	199	123	221
メチオニン	0.6%	201	199	116	
シスチン	0.3%	107			
メチオニン・シスチン計	0.9%	309	379	228	151
フェニルアラニン	1.0%	334	271	158	
チロシン	0.8%	271			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	605	434	260	256
スレオニン	0.9%	332	253	151	168
トリプトファン	0.3%	97	83	49	56
バリン	1.2%	405	289	172	137
ヒスチジン	0.7%	247	112	67	63
アルギニン	1.4%	478	199	123	179

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	344	270	250	180
ロイシン	590	463	440	410	105	113
リジン	600	471	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	309	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	605	475	380	390	125	122
スレオニン	332	261	250	210	104	124
トリプトファン	97	76	60	70	127	109
バリン	405	318	310	220	103	144
ヒスチジン	247	194	-	120	-	161
全窒素量(g)	1.3					

