

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	335	217	135	131
ロイシン	1.6%	576	397	241	209
リジン	1.6%	583	199	124	223
メチオニン	0.5%	191	199	117	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.8%	295	379	230	152
フェニルアラニン	0.9%	318	271	159	
チロシン	0.8%	266			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	584	434	262	259
スレオニン	0.9%	308	253	152	170
トリプトファン	0.3%	92	83	50	57
バリン	1.1%	387	289	174	138
ヒスチジン	0.6%	208	112	67	64
アルギニン	1.3%	458	199	124	181

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	335	277	250	180
ロイシン	576	475	440	410	108	116
リジン	583	481	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	295	243	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	584	482	380	390	127	124
スレオニン	308	254	250	210	102	121
トリプトファン	92	76	60	70	126	108
バリン	387	319	310	220	103	145
ヒスチジン	208	171	-	120	-	143
全窒素量(g)	1.2					

