

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	348	217	146
ロイシン	1.5%	586	397	262
リジン	1.5%	596	199	135
メチオニン	0.5%	194	199	127
シスチン	0.3%	121		
メチオニン・シスチン計	0.8%	314	379	250
フェニルアラニン	0.9%	346	271	173
チロシン	0.7%	268		
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	615	434	285
スレオニン	0.9%	341	253	165
トリプトファン	0.3%	103	83	54
バリン	1.1%	433	289	188
ヒスチジン	0.6%	215	112	73
アルギニン	1.3%	490	199	135

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	348	300	250	180
ロイシン	586	506	440	410	115	124
リジン	596	515	340	360	151	143
メチオニン・シスチン計	314	271	220	160	123	169
フェニルアラニン・チロシン計	615	532	380	390	140	136
スレオニン	341	295	250	210	118	140
トリプトファン	103	89	60	70	149	127
バリン	433	374	310	220	121	170
ヒスチジン	215	186	-	120	-	155
全窒素量(g)	1.2					

