

ver.4 参考の表へ		このレシピのエネルギー		98	kcal	体重の0.75乗		1.81	kg	計算では		0.62	日分となります											
		1日に与えるエネルギー		158	kcal	体 重		2.2	kg	実際は		1.0	日分とする											
		3/17(mon)		グラム		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1				このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量				このレシピでの上限量 *2				
						総重量				g	149.9				NRC		AAFCO				NRC		AAFCO	
						水分				g	120.2													
						乾燥重量				g	29.8				体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース				体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	
						エネルギー				kcal	97.9													
						エネルギー密度					3.3		kcal/g											
										</														

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	280	217	113	110
ロイシン	1.6%	468	397	203	176
リジン	1.7%	498	199	104	188
メチオニン	0.5%	162	199	98	
シスチン	0.3%	86			
メチオニン・シスチン計	0.8%	250	379	194	128
フェニルアラニン	0.9%	269	271	134	
チロシン	0.7%	215			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	484	434	220	217
スレオニン	0.9%	268	253	128	143
トリプトファン	0.3%	79	83	42	48
バリン	1.1%	325	289	146	116
ヒスチジン	0.9%	268	112	57	54
アルギニン	1.3%	374	199	104	152

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	280	274	250	180	109	152
ロイシン	468	458	440	410	104	112
リジン	498	488	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	250	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	484	474	380	390	125	121
スレオニン	268	262	250	210	105	125
トリプトファン	79	77	60	70	128	110
バリン	325	319	310	220	103	145
ヒスチジン	268	262	-	120	-	218
全窒素量(g)	1.0					

