

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	290	217	120	116
ロイシン	1.6%	491	397	214	186
リジン	1.6%	508	199	110	198
メチオニン	0.6%	174	199	104	
シスチン	0.3%	93			
メチオニン・シスチン計	0.9%	270	379	204	135
フェニルアラニン	0.9%	290	271	142	
チロシン	0.7%	229			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	518	434	233	230
スレオニン	0.9%	295	253	135	151
トリプトファン	0.3%	85	83	44	50
バリン	1.1%	354	289	154	123
ヒスチジン	0.9%	278	112	60	57
アルギニン	1.3%	410	199	110	160

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	290	265	250	180
ロイシン	491	449	440	410	102	109
リジン	508	464	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	270	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	518	474	380	390	125	121
スレオニン	295	269	250	210	108	128
トリプトファン	85	78	60	70	130	111
バリン	354	323	310	220	104	147
ヒスチジン	278	254	-	120	-	212
全窒素量(g)	1.1					

