

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	272	217	111	108
ロイシン	1.6%	454	397	198	172
リジン	1.6%	476	199	102	184
メチオニン	0.5%	159	199	96	
シスチン	0.3%	87			
メチオニン・シスチン計	0.8%	246	379	190	125
フェニルアラニン	0.9%	265	271	131	
チロシン	0.7%	210			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	475	434	216	213
スレオニン	0.9%	265	253	125	140
トリプトファン	0.3%	77	83	41	47
バリン	1.1%	315	289	143	114
ヒスチジン	0.7%	190	112	55	52
アルギニン	1.4%	394	199	102	149

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	272	279	250	180	112	155
ロイシン	454	468	440	410	106	114
リジン	476	490	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	246	254	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	475	488	380	390	129	125
スレオニン	265	273	250	210	109	130
トリプトファン	77	79	60	70	131	113
バリン	315	325	310	220	105	148
ヒスチジン	190	195	-	120	-	163
全窒素量(g)	1.0					

