

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			
イソロイシン	1.0%	325	217	120	117
ロイシン	1.8%	554	397	215	187
リジン	1.7%	541	199	111	199
メチオニン	0.6%	177	199	104	
シスチン	0.3%	109			
メチオニン・シスチン計	0.9%	286	379	206	136
フェニルアラニン	1.0%	322	271	142	
チロシン	0.8%	251			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	573	434	234	231
スレオニン	1.0%	308	253	136	152
トリプトファン	0.3%	94	83	44	51
バリン	1.2%	384	289	155	123
ヒスチジン	0.6%	198	112	60	57
アルギニン	1.5%	487	199	111	161

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	325	276	250	180	110	153
ロイシン	554	470	440	410	107	115
リジン	541	458	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	286	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	573	485	380	390	128	124
スレオニン	308	261	250	210	104	124
トリプトファン	94	80	60	70	133	114
バリン	384	325	310	220	105	148
ヒスチジン	198	167	-	120	-	140
全窒素量(g)	1.2					

