

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
イソロイシン	0.8%	302	217	139	136
ロイシン	1.4%	497	397	250	217
リジン	1.4%	510	199	128	231
メチオニン	0.5%	179	199	121	
シスチン	0.3%	97			
メチオニン・シスチン計	0.8%	278	379	239	158
フェニルアラニン	0.8%	295	271	165	
チロシン	0.6%	229			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	524	434	272	268
スレオニン	0.8%	291	253	158	176
トリプトファン	0.2%	88	83	51	59
バリン	1.0%	356	289	180	143
ヒスチジン	1.0%	372	112	70	66
アルギニン	1.1%	411	199	128	187

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	302	273	250	180	109	152
ロイシン	497	449	440	410	102	109
リジン	510	461	340	360	136	128
メチオニン・シスチン計	278	251	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	524	473	380	390	125	121
スレオニン	291	263	250	210	105	125
トリプトファン	88	80	60	70	133	114
バリン	356	322	310	220	104	146
ヒスチジン	372	336	-	120	-	280
全窒素量(g)	1.1					

